

domingo, 03 de agosto de 2008

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS ARTROSCOPIA DE RODILLA CON PERFORACIONES OSEAS

Paciente: GARCIA AGUILAR VICTOR.

- 1. Utilizar en forma constante la crioterapia por los primeros 4 a 5 días del postoperatorio a tolerancia y por necesidades de dolor. El aparato debe llevar agua y hielo hasta la línea interior y debe sentir el frío en la rodilla, nunca lo aplique directamente sobre la piel pues podrá quemarse. Puede suspenderla cuando no sienta ya ningún beneficio.**
- 2. Realizar los ejercicios indicados por lo menos durante 10 minutos cada hora mientras permanezca despierto:**
- 3. Levantar la pierna extendida**
- 4. Flexionar la rodilla**
- 5. Extender la rodilla mientras esta este sentado.**
- 6. Presionar hacia atrás con la rodilla extendida.**
- 7. Cinco días después de la cirugía ya es posible bañarse mojándose las heridas al final del baño retirándose los parches impermeables. Posteriormente secarlas y colocar nuevamente los parches además de sus medias compresivas.**
- 8. El riesgo de trombosis venosa es alto por lo que las indicaciones de medias y anticoagulante deben ser seguidas al pie de la letra para reducirlo al mínimo. Así mismo debe tomar sus medicamentos indicados en forma precisa.**
- 9. Caminar a tolerancia ayudado con muletas Y SIN APOYO DE LA PIERNA OPERADA por las próximas 4 semanas**
- 10. La próxima cita es dos semanas después de la cirugía, por favor llame al consultorio para confirmar la hora.**

11. Si existe alguna duda o contratiempo por favor contáctenos en el consultorio en días hábiles de 8 a 21 hrs. o al radio al 5629 9800 clave 1455 en otros horarios

DR. SALVADOR RIVERO BOSCHERT
SSA 89366 DGP 668807



